

التوالد اللاجنسي عند النباتات

تمهيد: تتكاثر النباتات الزهرية واللازهرية عادة عن طريق التوالد الجنسي الذي يتطلب تدخل الأمشاج الذكرية و الأنثوية. لكن توجد إمكانية أخرى للتوالد عند النباتات، تتم دون تدخل الأمشاج فتسمى بالتوالد اللاجنسي = التكاثر الخضري = التكاثر الانباتي = La multiplication végétative.

- كيف يتم هذا التوالد وما هي الأعضاء والخلايا المسؤولة عن حدوثه؟
- ما هي أهمية هذا التوالد بالنسبة للنباتات؟ وكيف يمكن استغلاله في الميدان الزراعي؟


I – التكاثر الخضري أو التكاثر الانباتي. أنظر الوثيقة 1.

الوثيقة 1: بعض أشكال التوالد اللاجنسي عند النباتات.

★ يتوفر سرخس الخنشار على ساق تحأرضية تدعى الجذمور يحمل جذورا وبراعم. يستطيل الجذمور ويتفرع ويظهر أوراق وبراعم جديدة وجذور (الشكل 1).

★ عند سرخس *Asplénium bulbiforme* تتكون على الأوراق مكان الأكياس البوغية بصيالات تنبت على النبات الأم لتعطي نباتات جديدة (الشكل 2).

★ عند سرخس *Lygodium* تتمدد نهاية نصل الأوراق بكيفية مفرطة، مشكلة رثدات *Stolons* عند تماسها مع التربة تبرز جذورا تنشأ عنها نبتة جديدة (الشكل 2) والشكل 3).




★ تحمل نهاية بعض الحزازيات بصيالات مكونة من تجمعات خلوية برعمية. عندما تنفصل هذه الكتل عن الحزازية، تتجذر وتنبت نبتة شبيهة بالنبتة الأم (الشكل 4).


★ درنة البطاطس ساق تحأرضية غنية بالمدخرات وتتوفر على عيون قادرة على إعطاء نباتات جديدة (الشكل 5).

★ تتكون البصلات من ساق تحأرضية قصيرة تحمل جذورا، وبراعم، وأوراقا تحأرضية، على شكل قشور لحمية غنية بالمدخرات المقيمة. ينمو البرعم المركزي ويعطي نبتة جديدة (الشكل 6).

★ تسقط أوراق نبات *Bégonia* على التربة الرطبة فتتجذر وتعطي نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الأم (الشكل 7).



- ★ يتكاثر طحلب الأسبيروجير (8) عن طريق استطالة الخلايا، متبوعة بانشطار ثنائي، حيث يمكن لبعض الخلايا بعد انفصالها عن الخيط الأصلي، أن تتكاثر لتعطي خيطا جديدا من الأسبيروجير. مثال تكاثر الكلاميدوموناس (9).
- ★ تتكاثر بعض الطحالب عن طريق التبوغ المباشر. حيث تخضع بعض الخلايا الأم لانقسامات غير مباشرة لتعطي أباغا ثنائية الصيغة الصبغية تدعى الأبواغ المباشرة. عند إنباته يعطي كل بوغ طحلبا جديدا.



انطلاقا من تحليل معطيات هذه الوثيقة، أعط تعريفا للتكاثر الخضري (الانباتي)، ثم حدد مختلف أشكال هذا التكاثر.

① تعريف التكاثر الانباتي.

التكاثر الانباتي هو مجموع الآليات المؤدية إلى تكون نباتات جديدة انطلاقا من الأعضاء النباتية للنبات الأم دون تدخل الأمشاج والإخصاب، ويتم بواسطة عدة أشكال.

② أشكال التكاثر الانباتي.

1- التكاثر بواسطة الجذوم Rhizome (الخنشار نموذجا)

يعتبر الجذوم ساقا تحارضية، يحمل جذورا و براعم مغطاة بحراشف بنية. يستطيل الجذوم ويتفرع على مستوى البراعم ليعطي نباتات جديدة. تموت الأجزاء القديمة للجذوم، وتختفي، وتصبح الأجزاء الحديثة مستقلة.

2- التكاثر بواسطة الدرنات Les Tubercules (نبات البطاطس نموذجا)

تمثل درنات البطاطس سيقان تحارضية غنية بالمدخرات المقيمة، وتحمل براعم. تنمو هذه الأخيرة، عند الإنبات، وتعطي سيقان فتية، تظهر في أسفلها جذور. تنمو كل ساق، وتعطي نبتة جديدة، مشابهة للنبتة الأصلية، تنتج بدورها عددا من الدرنات.

3- التكاثر بواسطة البصلات Les Bulbes

تتكون البصلات من ساق تحارضية قصيرة تحمل جذورا، وبراعم، وأوراقا تحارضية، على شكل قشور لحمية غنية بالمدخرات المقيمة. ينمو البرعم المركزي ويعطي نبتة جديدة تتغذى في مراحلها الأولى على مدخرات البصلة التي تتلاشى تدريجيا، وتنمو النبتة الجديدة وتزهر وتعطي بصلة جديدة.

4- التكاثر بواسطة الرئذات Les Stolons (نبات توت الأرض نموذجا)

ينتج نبات توت الأرض سيقان أفقية، تسمى الرئذات. عندما تتصل هذه الرئذات بالتربة، تنمو وتظهر في طرفها المورق جذورا، وتنشأ عندها نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الأصلية. بعد ذلك، تجف الرئدة، وتصبح النبتة الجديدة مستقلة، وتنتج بدورها رئذات جديدة.

5- التكاثر عن طريق التنصف Bipartition (طحلب Chlamydomonas نموذجا)

الكلاميدوموناس طحلب أحضر وحيد الخلية، يمكنه أن يتجزأ و يعطي خليتين بنيتين شبيهتين بالخلية الأم.

6- التكاثر بواسطة جزء من الورقة Bégonia (نبات Bégonia نموذجا)


تسقط أوراق نبات Bégonia على تربة غابوية رطبة فتتجذر وتعطي نبتة جديدة شبيهة بالنبتة الأم.

③ تطبيقات التكاثر الخضري في الميدان الزراعي.

وظف الإنسان خاصيات التكاثر الإنبائي الطبيعي في الميدان الزراعي، للزيادة من عدد النباتات. والحصول على توليفات نباتية جديدة مرغوب فيها. وتتجلى تقنيات التكاثر الإنبائي الاصطناعي في عدة ممارسات، منها الافتسال و الترقيد والتطعيم.

أ – الافتسال Le bouturage. أنظر الوثيقة 2.

الوثيقة 2: الافتسال Bouturage.




الشكل أ: مواقع المنس Le méri-stème في النبات.
الشكل ب: الافتسال عند نبات الغرنوق Géranium.
الشكل ج: الافتسال الدقيق Microbouturage لدرة البطاطس.


انطلاقا من معطيات الوثيقة:

- أعط تعريفا للمنس، وحدد موقعه في النبات.
- حدد فيم تتمثل عملية الافتسال.
- حدد العنصر الأساسي في عملية الافتسال.
- صف مراحل الافتسال الدقيق واستخرج شروط انجازه.
- استنتج أهمية الافتسال في الميدان الزراعي.

الشكل ب



الشكل ج



- 1: أخذ برعم من درنة البطاطس.
- 2: غرس البرعم في وسط زرع يتوفر على عناصر مقبلة وهرمونات نباتية بعد تعقيم الأنبوب والسداة.
- 3: بعد مرور شهر تتكون نبتة انطلاقا من البرعم.
- 4: تجزيء الفسيلة إلى قطع تتوفر كل منها على برعم.
- 5: إعادة عملية الزرع في عدة أوساط. (يمكن إعادة الاقترسال إلى ما لانهاية).
- 6: بعد تكون نبتة جديدة انطلاقا من الفسيلة في كل وسط زرع، توضع النباتات في التربة لبدء زراعة جديدة.

- المنس Le méristème هو مجموعة خلايا جد فتية تتميز بقدرية كبيرة على التكاثر، وهي مسؤولة على نمو النبات في الطول وفي العرض. وتتميز بقدرتها على التقريق لإعطاء نبتة جديدة تشبه النبتة الأم. يتموضع هذا النسيج أساسا في أطراف الجذور والطرف العلوي للساق وفي نقط بزوغ الأوراق.
- تتمثل عملية الاقترسال في طمر كلي أو جزئي لقطعة من عضو نباتي، غالبا ما تكون من الساق، كما يمكن أخذ قطعة جذر أو ورقة. وتسمى هذه القطعة فسيلة Bouture.
- تتميز الفسيلة بتوفرها على برعم مكون من خلايا منسية.
- تقتضي عملية الاقترسال الدقيق أخذ جزء من أحد أعضاء النبتة، ثم زرعها في أوساط زرع معينة وتحت ظروف ملائمة (= الزراعة في الزجاج). تتكاثر الخلايا المنسية ثم تتجذر فتعطي نباتات شبيهة بالنبتة الأم.
- يعتبر الاقترسال الدقيق أهم تقنية لإكثار النباتات ذات الصفات المرغوبة، حيث يسمح وفي وقت قصير من إنتاج عدد كبير من النباتات لها نفس الصفات الوراثية للنبتة الأم.


ب - الترقيد Le marcottage. أنظر الوثيقة 3.

الوثيقة 3: الترقيد Le marcottage

- الترقيد هو عملية عزل جزء الجهاز النباتي عن النبتة الأم بعد ظهور الجذور. ويمكن ملاحظة الترقيد الطبيعي عند نبات العليق الذي يتوفر على جذور عارضية، وعند النباتات الجذمورية أو الرندية كتوت الأرض.
- 1 الترقيد بالإرقاد Marcottage par couchage مثلا عند كرم العنب حيث يتم انحناء غصن وقرزه في التربة بعد جرحه طوليا، وتثبيته طوليا.
 - 2 الترقيد في الأصيص Marcottage en pot مثلا عند نبات القرنفل حيث يوضع في أصيص مملوء بالتربة غصن مقشر وحامل لجرح دائري.



- 3 الترقيد المتعدد.
- 4 الترقيد الهوائي Marcottage aérien نزيل أوراق غصن ثم نقطع جزءا حلقيا من لحاء الغصن ثم نغطي المنطقة المجروحة بتربة حتى تتكون جذور فنفصل الفسيلة عن النبات الأصلي.
- 5 الترقيد بالحضن Marcottage par buttage يقطع النبات الأم عرضيا لحصر النسغ مما يؤدي إلى تكون أغصان غنية بالجذور، حينئذ يمكن تقطيع كل غصن وإعادة زرعها في مكان آخر ليعطي نبات شبيه بالنبتة الأم.




انطلاقاً من معطيات الوثيقة بين فيم تتمثل عملية الترقيد، واستنتاج أهميته في الميدان الزراعي.

يتمثل الترقيد في طمر جزء من النبات في التربة دون فصله عن النبتة الأم إلى أن يتجذر فيتم فصل النبتة الجديدة عن النبتة الأم.

يقتضي التكاثر بالترقيد، مثل الاقتسال، على توفر الغصن المراد ترقيده على خلايا منسية تضمن التكاثر ونمو النبتة، هذا ما يبرر اشتراط توفر الغصن على عيون.

غالبا ما يطبق الترقيد في الميدان الزراعي على بعض أشجار الفواكه وبعض نباتات التزيين. ويضمن الترقيد الحفاظ على الصفات الوراثية للنباتات المرغوبة، إلا أن النبتة الأم يضعف عطاؤها، بالإضافة إلى أن هذه التقنية تحتاج لمساحات كبيرة، هذا ما جعل تطبيقها حاليا يبقى جد محدود خاصة مع التطور الكبير الحاصل في تقنيات الاقتسال الدقيق.

ج - التطعيم Le greffage. أنظر الوثيقة 4.



تقتضي هذه التقنية تثبيت طعم (غصن حامل لبرعم أو برعم فقط)، على نبات يمثل حامل الطعم، بحيث ينمو الطعم، و يعطي الفروع والأوراق.

يرتكز التطعيم على ربط مباشر بين أنسجة الحامل وأنسجة الطعم خصوصا بين أنابيب دوران النسغ (Xylème et Phloème) وبين كمبيومي Cambium النبتتين.

(الكمبيوم le cambium هو نسيج خلوي يوجد داخل ساق النبات، يتوفر على خلايا منسية تضمن التكاثر بفعل الانقسام).

هناك عدة أنواع من التطعيم حسب نوع الطعم، أهمها التطعيم الإدغامي والتطعيم بالشق والتطعيم ببرعم التطعيم.

يهدف التطعيم في الميدان الزراعي إلى إكثار النباتات المرغوب فيها (كأشجار الفواكه و نباتات التزيين) وتأمين الإخصاب عند بعض الأنواع وذلك بالجمع بين الأزهار الذكورية والأنثوية على نفس النبات.