

MALADIE PIEDS-MAINS-BOUCHE

TOUCHE PRINCIPALEMENT LES JEUNES ENFANTS ENTRE L'ÂGE DE 6 MOIS ET DE 4 ANS

ORIGINE

Virus coxsackie A16



PARTICULARITÉS



Incubation
3 à 6 jours



Guérison
1 semaine



été et
automne

COMPLICATIONS ⚡

Déshydratation, atteinte cardiaque, méningite.

RISQUE EMBRYO-FŒTAL

Risque d'infection
cardiaque chez le fœtus



ÉVICTION SCOLAIRE

Pas obligatoire

TRAITEMENT

Pour soulager les symptômes
et améliorer le confort.



PRÉVENTION



Lavage
mains



Lavage
objets souillés



Désinfection
surfaces



Gants jetables
pendant les soins



Sous-vêtements
propres



Nettoyage
litière



Partage objets
et linge

- SYMPTÔMES -

Peu d'altération de l'état général



Fièvre modérée
à sévère



Toux



Maux de
gorge



Rhinite




Troubles de
la déglutition



Troubles
digestifs

Vésicules ou cloques sur
certaines parties du corps



bouche
(évoluant vers des
ulcères buccaux)

mains

fesses

pieds



L'enfant est contagieux pendant l'incubation et la phase aiguë



Transmission par la salive, les sécrétions nasales ou les selles, par contact direct (d'enfant à enfant) ou indirect (par les objets souillés).

ORIGINE

Parvovirus B19



PARTICULARITÉS



Incubation
4 à 20 jours



Guérison
2 à 5 semaines



fin hiver et
printemps

COMPLICATIONS ⚡

Crise aplastique chez les sujets à risque, anémie chronique, méningo-encéphalite, myocardite, purpura thrombopénique, neutropénie transitoire.

FACTEURS DE RISQUE



Hémoglo-
binopathie



Anémie



Déficit
immunitaire

RISQUE EMBRYO-FŒTAL

Faible risque d'anasarque foeto-placentaire, mort foetale



PRÉVENTION



Lavage
mains



Lavage
objets souillés



Mouchoirs
jetables



Gants jetables
pendant les soins



Contacts
étroits



Lieux
publics

ÉRYTHÈME INFECTIEUX

OU MÉGALÉRYTHÈME OU PLUS COMMUNÉMENT APPELÉ LA CINQUIÈME MALADIE

CETTE MALADIE TOUCHE GÉNÉRALEMENT LES ENFANTS ENTRE L'ÂGE DE 5 ET 10 ANS

- SYMPTÔMES -

Peu d'altération de l'état général



Fièvre
modérée



Douleurs
articulaires



joues rouges

macules rosées



Démangeaisons
de la peau

- SIGNE PARTICULIER -



Rash réticulé



Traitement
symptomatique



la période la plus contagieuse est celle précédant l'apparition de l'éruption cutanée

ORIGINE

Streptocoque β -hémolytique du groupe A

ÉVOLUTION



Incubation 1 à 5 jours



Guérison rapide sous antibiotiques



Surtout en hiver

COMPLICATIONS ⚡

Abcès péri-amygdalien, rhumatisme articulaire aigu, glomérulonéphrite aiguë.

PRÉVENTION



Hygiène habituelle



Aération du logement



Température entre 18 et 20°C



Exposition au tabac



Partage objets et linge



Contacts étroits

FACTEURS DE RISQUES



Rhumatisme articulaire aigu



Atteinte rénale

CONTAGIOSITÉ ⌚

Maximale au stade aigu. L'enfant sera contagieux pendant plusieurs jours ou semaines sans traitement.

TRAITEMENT 💊

Antibiothérapie orale pendant environ 6 jours.

LA SCARLATINE

TOUCHE SURTOUT LES ENFANTS ENTRE 5 ET 10 ANS



Ne pas confondre avec une dermatite de contact, la maladie de Kawasaki, une allergie ou la rougeole

- QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? -

État général plus ou moins bon



Fièvre



Mal de gorge, dysphagie



Douleurs abdominales



Nausées, vomissements



ÉVICTION SCOLAIRE

Du diagnostic jusqu'à 48h après le début des antibiotiques.



RISQUE EMBRYO-FŒTAL

Aucun effet négatif connu sur le fœtus.